



कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय



पशु सेवा शाखा
गागलफेदी, काठमाडौं
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
पशु सेवा शाखा
गागलफेदी, काठमाडौं
बागमती प्रदेश, नेपाल
२०७३

फोन नं.: ०१-४४५१२४२
फ्याक्स: ०१-४४५०३५६
टोल फ्रि नं.: १६६००१२७७७७

पत्र संख्या: २०७९/०८०

मिति: २०८०/१०/०२

चलानी नं

विषय: पशु पालक कृषकहरुमा सादर अनुरोध ।

प्रस्तुत विषयमा हाल देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा गाई भैंसीहरुमा लाग्ने लम्पी स्किन रोगको प्रकोप बढिरहेको जानकारी प्राप्त हुन आएकोले यस रोग फैलिन नदिन चौपाय पशुहरु ओसार पसार नगरिदिनु भई रोग नियन्त्रण कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन सम्पूर्ण कृषक महानुभावहरुमा सादर अनुरोध गर्दछौं ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका,

पशु सेवा शाखा, गागलफेदी ।

लम्पी स्किन रोगबारे जानकारी

परिचय

- यो रोग गाईभैसीमा देखिन्छ।
- यो रोग मानिसहरूलाई सार्दैन।
- गर्मी मौसममा टोके झिगा (डॉस), लामखुट्टे, किर्ना जस्ता किराहरूको संख्या बढी हुने तथा थप सक्रिय हुने हुनाले यस रोगको प्रकोप बढी देखिन्छ।
- दूध उत्पादनमा तीव्र गिरावट आउँदछ।
- प्रजनन समस्या आउने तथा गर्भपतन हुन सक्दछ।
- भैसीको छालाको गुणस्तरमा हास आउँदछ।
- वजन घट्ने र कहिलेकाहीँ मृत्यु समेत हुन सक्दछ।
- गाईभैसीहरूको ओसारपसार तथा व्यापारमा प्रतिबन्ध गर्नु पर्ने हुँदा थप आर्थिक नोक्सानी हुने गर्दछ।

लक्षणहरू

- संक्रमित गाईभैसीले निम्न अनुसारका लक्षणहरू देखाउँदछन्:
- उच्च ज्वरो (१०४ डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि), दाना पानी कम खाने र दूध उत्पादन घट्दछ।
 - छालामा १-५ सेन्टिमिटरको साह्रो गोलो गिर्खाहरू (सामान्यतया सुरुमा टाउको र घाँटीमा) देखिन्छ। लामो रौ भएको गाईभैसीमा गिर्खाहरू सजिलै देखिदैनन्। जिउ छाम्दा तथा पानीले भिजेको अवस्थामा मात्र पत्ता लगाउन सकिन्छ।
 - सामान्य संक्रमणमा गिर्खाहरूको संख्या धेरै र गम्भीर संक्रमणहरूमा पूरै शरीर ढाक्ने गरी हुन सक्दछ।
 - गिर्खाहरू केही समय पछि हराउन सक्छन् तर कहिलेकाहीँ गिर्खाहरू फुटेर गहिरो घाउ भई किरा तथा झिगाहरूले (औसा) घाउलाई थप जटिल बनाउन सक्दछन्।
 - थुतुनो, ओठ, मुख र नाकभित्र घाउ देखिन्छन्।
 - आँखा र नाकबाट अत्यधिक मात्रामा तरल पदार्थ आउछ।
 - न्याल काढ्छ।
 - लिम्फ नोडहरू सुत्रिने हुन्छ।
 - केही संक्रमित गाईभैसीहरूले कुनै पनि लक्षण नदेखाउन सक्छन्।

रोग सर्ने तरिका

- संक्रमित लामखुट्टे, टोके झिगा र किर्ना जस्ता किराहरूको टोकाइबाट,
- संक्रमित गाईवस्तुहरूको ओसारपसारबाट,
- सामुदायिक चरन क्षेत्र तथा दाना तथा पानी खाने ठाउँहरूबाट,
- प्राकृतिक वा कृत्रिम गर्भधानबाट,
- पशु उपचार गर्ने क्रममा फरक गाईभैसीहरूमा एउटै सुइको प्रयोगबाट,
- कहिलेकाहीँ प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट



भैसीको शरीरभरि साना साना गिर्खाहरू देखिएको



पछाडिको भाग र थुन वरिपरि गिर्खा देखिएको

उपचार

यो रोगको प्रभावकारी उपचार छैन। रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम उपाय हो।

रोगको शंका लागेमा के गर्ने ?

- रोगको प्रकोपको समयमा वा जोखिममा रहेका क्षेत्रमा पर्ने गाईभैसीहरूको दैनिक निरीक्षण गर्नु पर्छ।
- पशुहरूलाई रोग लागेको शंका भएमा तुरुन्त प्राविधिक, स्थानीय तहको पशु सेवा शाखा, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विश्व केन्द्र, पशु सेवा विभाग र अन्तर्गतका निकायलाई जानकारी दिनुहोस।
- लम्पी स्किन रोग भएको अवस्थामा रोग देखिएको क्षेत्रबाट पशुहरूको ओसारपसार तुरुन्त रोक्नु पर्छ।

फार्मको सुरक्षा कसरी गर्ने ?

- खोप लगाएर- प्रभावकारी खोप लगाएको तीन हप्ता भित्रमा रोग विरुद्ध पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हुन्छ।
 - संक्रमित हुनु अघि नै गाईभैसीलाई खोप लगाउनु पर्छ।
 - खोपले कहिलेकाहीँ केही गाईभैसीमा निम्न अनुसारका प्रतिक्रियाहरू देखाउन सक्छ:
 - खोप लगाएको ठाउँमा हलुका सुत्रिन्छ जुन १-२ हप्ता भित्रमा आफै हराएर जान्छ।
 - छोटो समयको लागि ज्वरो आउनुका साथै केही दिन दूध उत्पादन घट्न सक्दछ।
 - शरीर वा थुनमा साना गिर्खाहरू देखिन सक्छ जुन छिट्टै हराउँदछन्।
- विश्वसनीय स्रोतहरूबाट गाईभैसी खरिद गर्नुपर्दछ। गाईभैसी खरिद गरी ल्याएमा २८ दिनसम्म बथानबाट अलग्गै राख्नुपर्दछ। रोगको प्रकोपको समय रोग लागेको ठाउँबाट गाईभैसी ल्याउनु हुँदैन।
- गोठलाई झिगा, लामखुट्टे तथा अन्य किराहरूबाट मुक्त राख्न सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्दछ र आवश्यकता अनुसार उपयुक्त कीट विकर्षकको प्रयोग गर्नुपर्दछ।
- गोठ वरिपरि पानी जम्न दिनु हुँदैन।
- फार्ममा जैविक सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ।



गिर्खा फुटेपछिको घाउ

शरीरभरि गिर्खा देखिएको गाई

थप जानकारीका लागि
पशु सेवा विभाग, हरिहरभवन

फोन नं. ०१-५५२२६१०, ०१-५५२५४८८, ०१-५५२२०५६
वेब: www.dls.gov.np



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

